Observation

Sur vne hernie de vessie et d'intestin, compliquée d'etranglement.

Il serendit Le 4.e 9.bre 1764 a l'hôtel dieu vn homme agé de 52 ans, qui avoit vne hernie inguinale compttette, avec etranglement. Espece de Maladie que l'on voits souvent dans cet hopital et que lon ne gueri pas souvent, par ce que ceux qui en sont attaquée, si rendent quand le mal Est dans son dernier degré, et trés souvent, aprés avoir eprouvé des remedes de charlatans, ou de bonnes femme, dela vient quil est fort rare de guerir cette maladie, quoi que lon fasse Loperation aussy promptement quil est posible. La hernie dont il est question, etoit dans ce cas, le Gonflement et la douleur de tout le ventre, la tention et la grosseur de la tumeur, le hoquet, les vomissements de matieres fecales, la frequence, et la concentration du pouls, &a. qui acompagnoient depuis huit jour cette hernie, manifestoit asée le grand danger ou etoit le malade; nous nous determinames a notre premiere visites, Monsieur Moreau et moy, a faire a cette homme L'operation; sur le champ, lorsque jus fait l'ouverture des teguments et du sac,

ARC 15 d. 8

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

et debridé L'anneau, jereduisis l'intestin qui etoit trés
enflamé, et meme d'un rouge fort brun, aprés quoi
japperçus une partie qui etoit fort adherentes au sac,
que je pris pour une portion depiploon, que je
n'examinay pas, parcequel me paroissoit hors
d'etat d'etre reduite, Cependant, quoi que l'intestin
fut bien reduit, et que la partie que nous avions
prise pour de l'epiploon ne fut plus génée; il
n'y eut aucune diminution dans les accidents:
Au contraire, Le malade se plaignoit encorre
plus quil n'avoit fait avant L'operation, la
frequente envie d'uriner, et des douleurs à
l'extremité de la verge. a la levée du premier
apareil je reconnus par un Examin plus Exact,
que ceque nous avions pris pour de l'epiploon
etoit une portion de la vessie qui avoit passé
par L'anneau, et que ces membrannes trés
epaises en avoit fait prendre le change, enfin le
Malade allant toujour de plus mal en plus
mal, termina ces jours le landemin, cest adire
a la fin du Second jour de l'operation. je fit
l'ouverture du cadavre, jetrouvay tout l'intestin
illeum gangrené, le Jejunum et le duodenum
et les autres parties voisines trés enflamée,
quand a la vessie elle etoit partagée en deux

portions, celle qui etoit dans le Bassin formoit une capacité plus petite que celle qui etoit dans le scrotum les parois de celle cy, etoient aussy très epaisse, et je ne trouvay point d'urine dans cette portion deplacée, La partie qui separoit ces deux portions etoit si etroite, que je ne put introduire un stilets d'une capacité dans l'autre, ce qui etoit La Cause des frequentes envies d'uriner, et des douleurs que le malade avoit en urinant, et qui lui fesoit croire qu'il avoit la piere.

Si L'on fait attention, au retrecissement situé entre les deux portions de la vessie, et a L'adherence intimes qu'avoit celle qui etoit deplacée, ne pouroit on pas presumer que cette hernies de vessie, dans ce sujet, etoit un vice de conformation, comme Monsieur Mery. Le pensoit, et qui n'auroit pas empesché le malade de guerir de l'operation, si on lui eut fait plustot &a.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

No 118.